



Italia

Sorveglianza degli enterobatteri patogeni: SCHEDA DI NOTIFICA CAMPIONE ORIGINE UMANA

A. Origine e caratteristiche del campione biologico

1. Laboratorio di origine:	
Prov.	
2. Prelievo effettuato nel comune di (località):	
Prov.	
3. Ospedale (se diverso da laboratorio origine):	
4. Codice dello stipite assegnato dal laboratorio di origine:	5. Data prelievo del campione:

B. Informazioni sugli stipiti

1. Trasmissione ^(a) :	
2. Motivo di esecuzione dell'esame colturale: ☐ Non noto ☐ Infezione acuta ☐ Inchiesta epidemiologica ☐ Controllo (Specificare)	
3. Tipo campione: ☐ Feci ☐ Sangue ☐ Liquor ☐ Urine ☐ Pus ☐ Altro (specificare):.....	
4. Cognome e Nome:	
5. Sesso: ☐ Non noto ☐ Maschio ☐ Femmina	
6. Data di nascita:	7. Età, anni:
8. Comune di residenza del paziente (località):	
Prov.	
9. Viaggi effettuati nei 30 gg prima dell'insorgenza dei sintomi: ☐ Non noto ☐ No ☐ Sì (spec. dove):.....	
10. Paziente ospedalizzato: ☐ Non noto ☐ No ☐ Sì Se sì indicare nome reparto:	
11. Esito: ☐ Sconosciuto ☐ Deceduto ☐ Dimesso	
12. Alimenti implicati: ☐ Non noto ☐ No ☐ Sì (spec.)	
13. Se alimenti implicati, in base a: ☐ Sospetto ☐ Dati epidemiologici ☐ Isolamento microbiologico ☐ Dati epidemiologici + isolamento microbiologico	

C. Identificazione microbiologica

1. Identificazione: ☐ Salmonella ☐ Shigella ☐ Campylobacter ☐ Yersinia ☐ E. coli VTEC ☐ altri E. coli patogeni ☐ altro (spec.)					
2. Specie:					
3. Sensibilità agli antibiotici per Salmonella/Shigella/Yersinia (segnare il valore di MIC o il diametro in mm per Kirby-Bauer): ^(b)					
Amp	Ctx	Caz	Fox	Amc	Mem
Cip	Pef	Na	Gm	Su	Tmp
C	Te	Tig	Col	Azm	S
4. Sensibilità agli antibiotici per Campylobacter (segnare il valore di MIC o il diametro in mm per Kirby-Bauer):					
CIP	Te	Gm	E		

D. Parte riservata al laboratorio di riferimento (CRREP sezione di Tolentino)

1. Codice assegnato allo stipite:			2. Data ricevimento:		
3. Tipizzazione finale:			4. Data tipizzazione:		
5. Profilo di MLVA			6. NGS: ☐ Sì ☐ No		
7. Sensibilità agli antibiotici per Salmonella/Shigella/Yersinia (segnare il valore di MIC o il diametro in mm per Kirby-Bauer):					
Amp	Ctx	Caz	Fox	Amc	Mem
Cip	Pef	Na	Gm	Su	Tmp
C	Te	Tig	Col	Azm	S
8. Sensibilità agli antibiotici per Campylobacter (segnare il valore di MIC o il diametro in mm per Kirby-Bauer):					
CIP	Te	Gm	E		

^{a)} animale-uomo; alimento inclusa acqua potabile; associazione con cure sanitarie; uso di droghe iniettive; esposizione occupazionale (laboratorio); madre-bambino (durante la gravidanza o il parto); trapianto d'organo; persona-persona (fecale-orale escluso madre-bambino e sessuale); acqua ricreazionale; sessuale; trasfusione; sconosciuta; altro.

^(b) Amp: ampicillina; Cip: ciprofloxacina; C: cloramfenicolo; Ctx: cefotaxime; Pef: pefloxacina; Te: tetraciclina; Caz: ceftazidime; Na: acido nalidixico; Tig: tigeciclina; Fox: ceftoxitina; Gm: gentamicina; Col: colistina; Amc: amoxicillina+acido clavulanico; Su: sulfossazolo; Azm: azitromicina; Mem: meropenem; Tmp: trimethoprim; S: streptomycin; E: eritromicina